

# II - Tirages

Combinaisons, arrangements, factorielles, puissances, ... comment choisir ? Nous allons présenter ces différentes méthodes de dénombrement dans le cadre d'un tirage dans une urne.

Soient  $n$  et  $p$  deux entiers naturels non nuls. On considère une urne contenant  $n$  boules numérotées de 1 à  $n$ . On tire  $p$  boules dans cette urne. La manière de dénombrer le nombre de tirages possibles dépend de la manière dont les tirages sont effectués.

## I - Successivement, Avec remise

### Proposition 1 - Nombre d'applications

Le nombre d'applications de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  est égal à  $n^p$ .

### Exemple 1 - Urne

On suppose que les  $p$  tirages sont effectués successivement et avec remise dans l'urne, après chaque tirage, de la boule tirée.

On distingue ce qui se passe à chacun des tirages :

- \* au 1<sup>er</sup> tirage, l'urne contient  $n$  boules. La boule tirée porte un numéro compris entre 1 et  $n$  :  $n$  possibilités,
- \* au 2<sup>e</sup> tirage, l'urne contient  $n$  boules. La boule tirée porte un numéro compris entre 1 et  $n$  :  $n$  possibilités,
- \* ...
- \* au  $p$ <sup>e</sup> tirage, l'urne contient  $n$  boules. La boule tirée porte un numéro compris entre 1 et  $n$  :  $n$  possibilités,

Au final, il y a

$$n \times n \times \dots \times n = n^p \text{ possibilités.}$$

Ici, un tirage peut être représenté par une application de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  qui donne le numéro de la boule obtenue au  $i$ <sup>e</sup> tirage.

## II - Successivement, Sans remise

### Proposition 2 - Nombre d'injections

Le nombre d'injections de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  est égal à

$$\begin{cases} 0 & \text{si } n > p, \\ \frac{n!}{(n-p)!} & \text{si } n \leq p. \end{cases}$$

### Exemple 2 - Urne

On suppose que les  $p$  tirages sont effectués successivement et sans remise dans l'urne, après chaque tirage, de la boule tirée.

Si  $p > n$ , le nombre de boules à tirer est strictement plus grand que le nombre de boules dans l'urne. Comme les tirages s'effectuent sans remise, il n'est pas possible d'effectuer un tel tirage ! Le nombre de tirages possibles est donc nul.

Si  $p \leq n$ , on distingue ce qui se passe à chacun des tirages :

- \* au 1<sup>er</sup> tirage, l'urne contient  $n$  boules. La boule tirée porte un numéro compris entre 1 et  $n$  :  $n$  possibilités,
- \* au 2<sup>e</sup> tirage, l'urne contient  $n - 1$  boules. La boule tirée porte un numéro compris entre 1 et  $n$  à l'exception du numéro de la première boule :  $n - 1$  possibilités,
- \* au 3<sup>e</sup> tirage, l'urne contient  $n - 2$  boules. La boule tirée porte un numéro compris entre 1 et  $n$  à l'exception des numéros des deux premières boules :  $n - 2$  possibilités,
- \* ...
- \* au  $p$ <sup>e</sup> tirage, l'urne contient  $n - p + 1$  boules. La boule tirée porte un numéro compris entre 1 et  $n$  à l'exception des numéros des  $p - 1$  premières boules :  $n - p + 1$  possibilités,

Au final, il y a

$$n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1) = \frac{n \times \dots \times (n - p + 1) \times (n - p) \times \dots \times 1}{(n - p) \times \dots \times 1}$$

$$= \frac{n!}{(n - p)!} \text{ possibilités.}$$

Ici, un tirage peut être représenté par une application injective de  $\llbracket 1, p \rrbracket$  dans  $\llbracket 1, n \rrbracket$  qui donne le numéro de la boule obtenue au  $i^{\text{e}}$  tirage. L'application est injective car une même boule ne peut pas être tirée plusieurs fois donc son numéro apparaît au plus une fois dans l'ensemble image de l'application.

### III - Simultanément

#### Proposition 3 - Parties

Le nombre de parties à  $p$  éléments d'un ensemble à  $n$  éléments est égal à

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} 0 & \text{si } p > n, \\ \frac{n!}{(n-p)!p!} & \text{si } p \leq n. \end{cases}$$

#### III.1 - La version simultanée

##### Exemple 3 - Urne

On suppose que les  $p$  tirages sont effectués simultanément (on peut imaginer une pince qui descend dans l'urne et remonte en ayant attrapé exactement  $p$  boules).

Un tirage est alors une partie, contenant  $p$  boules, des  $n$  boules de l'urne. Ainsi, le nombre de tirages possibles est égal à  $\binom{n}{p}$ .

### III.2 - La version séquentielle

#### Exemple 4 - Urne

On suppose que les  $p$  tirages sont effectués simultanément.

On s'intéresse uniquement au cas où  $p \leq n$ , i.e. le nombre de tirages est inférieur au nombre de boules tirées.

Pour effectuer un tirage de  $p$  boules simultanément, on peut tirer les boules successivement puis oublier l'ordre dans lequel on les a tirées.

En reprenant les parties précédentes, le nombre de tirages successifs et sans remises possibles est égal à :

$$\frac{n!}{(n - p)!}$$

Un tirage est alors un  $p$ -uplet  $(n_1, \dots, n_p)$  de numéros deux à deux distincts et ordonnés.

Pour *oublier* l'ordre des boules, il faut compter le nombre de tirages successifs qui correspondent à un même tirage simultané. Par exemple, le tirage simultané  $\{1, 2, 3\}$  correspond aux tirages successifs  $(1, 2, 3)$ ,  $(1, 3, 2)$ ,  $(2, 1, 3)$ ,  $(2, 3, 1)$ ,  $(3, 1, 2)$ ,  $(3, 2, 1)$ .

En général, étant données  $p$  boules portant des numéros différents, il y a :

- \*  $p$  manières de choisir la 1<sup>re</sup>,
  - \*  $p - 1$  manières de choisir la 2<sup>e</sup>,
  - \* ...
  - \* 1 manière de choisir la  $p^{\text{e}}$ ,
- soit  $p!$  manières de les ordonner.

Ainsi, il y a  $p!$  tirages successifs qui donnent un même résultat de tirage de boules simultanées. Ainsi, le nombre de tirages simultanés possibles est égal à

$$\frac{n!}{(n-p)!p!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = \binom{n}{p}.$$

Un tirage est alors un ensemble  $\{n_1, \dots, n_p\}$ .